programmes CHANCE de 2009 et les buts finals d'intervention. Ont également été présentées les données existantes sur la prévalence du trachome, pour chaque pays, données qui ont été utilisées pour guider la planification de programme. Par ailleurs, les programmes nationaux ont

Centre Carter à Atlanta pour se pencher la performance du programme et de projets de recherche spécifiques. Les

Program Review

suite de la page 1

Clubs, Helen Keller International, Pfizer Inc, Research Triangle Institute International et l'Initiative internationale du trachome. Le Dr Saul Rajak de l'Ecole d'hygiène et de médecine tropicale de Londres et le Dr Jeremy Keenan de la Fondation Francis I. Proctor de University of California San Francisco ont présenté les résultats des activités de recherche opérationnelle en Ethiopie.

Les données des enquêtes de prévalence récentes du Mali ont également été examinées dans le contexte de la surveillance à long terme du trachome. Le Dr Jeremiah Ngondi a présenté une nouvelle boîte à outils, fort utile pour les enquêtes sur la prévalence du trachome. Elle contient divers matériels adaptés à chaque stade d'une enquête, allant de la formation à la gestion de données. Le Dr Silvio Mariotti de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fait savoir que l'OMS était pleinement engagée à apporter aux programmes nationaux l'assistance technique nécessaire pour qu'ils puissent atteindre les objectifs d'élimination.

Les résultats de la revue de cette année sont encourageants puisqu'un grand nombre de programmes nationaux ont atteint, voire dépassé leurs objectifs d'intervention de 2009. Les accomplissements des programmes nationaux signalés pour 2009 sont indiqués ci-après (voir également les Tableaux 1 et 2).

Ethiopie

PERSONNES EXPOSÉES

s LATRINES FAMILIALES ONT ÏTÏ
construites à échelle nationale

Niger

s PERSONNES ONT ÏTÏ OPÏRÏES
du trichiasis

s DOSES D AZITHROMYCINE ONT
été distribuées

s VILLAGES ONT ÏTÏ COUVERTS PAR UNE
éducation sanitaire continue

s LATRINES FAMILIALES ONT ÏTÏ
construites à échelle nationale

Gouvernement du Soudan

s

participants ont discuté de l'intégration de la lutte contre la cécité des rivières à d'autres initiatives de santé publique notamment la filariose lymphatique, le paludisme, la schistosomiase, le trachome et la supplémentation en vitamine A.

Sont venus se joindre au personnel du Centre Carter des représentants de ministères de la santé du Cameroun, de l'Ethiopie, du Nigeria, du Soudan et de l'Ouganda, de Merck & Co., Inc. et du Programme de donation de Mectizan®, de la Fondation Bill et Melinda Gates, la population ciblée devant recevoir un traitement en 2009, ce qu'on appelle le but final de traitement ou UTG. C'est un réseau à la base, composé de distributeurs d'ivermectine, dirigés par la communauté, qui est chargé d'apporter les traitements. Environ 225 000 distributeurs ont été formés en 2009, encadrés par plus de 35 000 superviseurs. Les programmes recevant

programmes du Centre Carter ont aidé à distribuer environ 80 000 moustiquaires durables imprégnées aux insecticides dans quatre états. La moitié d'entre elles ont été achetées grâce au soutien financier de la Fondation Bill et Melinda Gates, puis distribuées dans les états d'Imo et

d'éliminer l'onchocercose quant c'est faisable. Les activités actuelles d'élimination sont réalisées actuellement dans tous les six pays des Amériques et dans des foyers désignés en Ouganda et au Soudan. En 2009, les régions sous contrôle ont fourni

MILLIONS DE TRAITEMENTS ANNUELS

que les zones d'élimination ont fourni environ 2,4 millions de traitements.

Les résultats des programmes des divers pays en 2009 sont présentés ci-après.

Nigeria

Plus de 5,3 millions de traitements de masse de Mectizan ont été fournis par le Programme de la cécité des rivières au Nigeria en 2009 (100% d'UTG) ainsi que 463 044 traitements passifs, fournis par le biais des centres de santé.

LE NIGERIA A FORMÏ OU RECYCLÏ

distributeurs communautaires pour qu'ils puissent se charger de la distribution. D'après une évaluation de l'impact programmatique des activités annuelles de traitement réalisées en 2009 dans les états du Plateau et de Nasarawa (voir Figure 2), les taux d'infection (nodules)

ONT RECULÏ DE DEPUIS

convient de noter tout particulièrement le fait que les taux d'infection chez les enfants étaient non existants, nous indiquant qu'on serait peut-être arrivé à éliminer la transmission de l'onchocercose. Notable également le fait que, dans ces deux états, le Programme de la cécité des rivières est intégré au Programme d'élimination de la filariose lymphatique, réalisé avec un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates et de GlaxoSmithKline et que les traitements de Mectizan pour la cécité des rivières sont combinés à l'albendazole pour interrompre la transmission de la filariose lymphatique. Environ 3,5 millions de traitements combinés à base de Mectizan et d'albendazole ont été dispensés en 2009. Aussi, est-il possible que la combinaison thérapeutique servant à l'élimination de la filariose lymphatique a pour avantage supplémentaire d'interrompre simultanément la transmission de l'onchocercose.

C'est la deuxième année de suite que le Nigeria dépasse la barre d'un million de traitements de praziquantel dans les trois états qui disposent d'un programme de lutte contre la schistosomiase. C'est grâce au don de praziquantel, fait depuis 2008 par Merck KGaA de l'Allemagne (E-Merck) au Centre Carter, et transitant par l'Organisation mondiale de la Santé, que les taux de traitement ont grimpé de

CINQ FOIS LEUR NIVEAU DE $E PLUS LES